

Die häufigsten Wechsel- und Nebenwirkungen der 100 Top-Medikamente

Doxycyclin *Doxycyclin*



Verordnet bei

- Bakterieninfektionen der Atemwege, des HNO-Bereichs, der Geschlechtsorgane, des Magen-Darm-Trakts, der Gallenwege
- Hauterkrankungen
- Augenbindehautentzündung (Chlamydien-Konjunktivitis)
- Lyme-Borreliose



Mögliche Nebenwirkungen

- Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Magendruck, Sodbrennen, Brechreiz, Erbrechen, Blähungen, Durchfall)
- Blutgerinnungsstörungen
- Entzündungen im Mund/Rachen (Heiserkeit, Schluckbeschwerden)
- Blut im Urin
- Allergische Hautreaktionen
- Überempfindlichkeiten



Mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

- Mittel mit Aluminium, Magnesium (enthalten u.a. in Mitteln zur Bindung von Magensäure) und Calcium sowie Eisenpräparate
- Mittel gegen erhöhte Blutfettwerte (Colestyamin)
- Antibiotika (Rifampicin, Penicilline, Cephalosporine)
- Beruhigungs- und Schlafmitteln (Barbiturate)
- Mittel gegen Epilepsie (Carbamazepin, Diphenylhydantoin, Primidon)
- Diabetes-Mittel (Sulfonylharnstoff-Antidiabetika)
- Blutgerinnungshemmer (Antikoagulantien vom Dicumarol-Typ)
- Immunsuppressiva (Ciclosporin A)
- Narkose-Mittel (Methoxyfluran)
- Mittel Hautkrankheiten (Isotretinoin)
- Asthma-Mittel (Theophyllin)